

# ALBENKYN L

## Antiparasitario Interno - Premix para uso oral en alimento

### FORMULA:

1 g de product contiene:

Albendazol ..... 100 mg

Levamisol HCl ..... 20 mg

Excipientes c.s.p..... 1 g



Uso Veterinario



### DESCRIPCIÓN:

Albenkyn L es un antiparasitario interno que tambien actua como inmunoregulador, con poder ovicida, de protección sostenida y fácil administración.

### PRESCRIPCIÓN:

Albenkyn L es un antiparasitario interno de amplio espectro de acción sostenida para el tratamiento de cerdos y bovinos contra nematodos, trematodos (fasciola hepática), infestación de cestodos y contra casos maduros e inmaduros de nematodos gastrointestinales (ascaris suum, strongyloides ransomi, oesophagostomun dentatum, etc.) ) y pulmonar (metastrongylus sp.); Gastroenteritis verminosa, bronconeumonía parasitaria. Albenkyn L es el tratamiento indicado contra la infestación con diferentes parásitos en aves como ascaris, heterakis, tenias, capilares, etc.

### DOSIFICACIÓN Y USO:

Uso oral, mezclado con pienso, según las siguientes proporciones:

**Bovinos:** Helmintos gastrointestinales y pulmonares 5 mg / kg / b.w. Ostertagia tipo li: 7,5 mg / kg / b.w. Fasciola hepática: 10 mg / kg / b.w. Duración del tratamiento: 5 días seguidos. Administrar como única alimentación.

**Cerdos:** 15 mg / kg / peso corporal / día.

**Aves de corral:** 1 kg de Albenkyn L en 1000 kg de alimento durante 7 días seguidos. Administrar como única alimentación. Es conveniente repetir el tratamiento 15 días después de la primera realización para evitar la reinfestación parasitaria.

Premezcle 1 kg de Albenkyn en 10 kg de alimento y luego agregue el resto hasta completar 1000 kg de alimento medicado. En cantidades mayores procedemos en proporción.

Es conveniente mezclar la cantidad de producto que se utilizará en una cantidad adecuada de alimento (25 kg) antes de agregarlo al volumen final de la porción de alimento.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis según las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

### PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Almacene en su empaque original en un lugar fresco y seco entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. No tire recipientes vacíos en vertederos abiertos, deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Mantenga una ventilación adecuada cuando administre el producto. Cierre el recipiente herméticamente después de cada uso. Validez después de ser mezclado con el alimento: 15 días. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida al albendazol y / o al levamisol.

Efectos secundarios: trastornos gastrointestinales ocasionales, vómitos, diarrea, hipersalivación, espuma en la boca, edema pulmonar, disnea, broncoespasmo, temblores, nerviosismo, ataxia (falta de coordinación de los movimientos), hiperestesia, debilidad, colapso, convulsiones. Estos efectos indeseables generalmente desaparecen de 1 a 2 horas después de la administración. Si nota efectos secundarios graves u otros efectos no mencionados en este aviso, informe a su veterinario.

Albenkyn L no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios a las dosis recomendadas.

Restricciones de uso: Período de retiro para aves: 7 días. Cerdos: 5 días. Bovinos: 15 días. Leche: 4 días (8 ordeños).

No lo use en los primeros 45 días de gestación, ni dentro de los 45 días posteriores al parto. No utilizar en gallinas ponedoras que producen huevos para consumo humano. No use el producto en gallinas reproductoras en producción de huevos fértiles

### ENVASES:

1 kg, 5kg y 20 kg.

*Puede ser posible que no todos las presentaciones se comercialicen.*

