

CEFAKYX



Uso veterinario



Antibiótico - Suspensión estéril inyectable

FORMULA:

1 ml de producto contiene:

Cefalexina180 mg

Excipiente oleoso c.s.p.....1 ml

DESCRIPCION:

Cefakyx es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las cefalosporinas, con acción bactericida sobre un grupo frecuente de gérmenes patógenos Gram positivos y negativos sensibles al espectro de la Cefalexina. Cada mililitro contiene Cefalexina sódica en una cantidad equivalente a 180 mg. de Cefalexina.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de un amplio rango de infecciones generadas por bacterias sensibles al espectro de la cefalexina: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Proteus spp, Micrococcus spp, Moraxella spp, Actinobacillus lignierese, Actinomyces bovis, Haemophilus spp, Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp, Salmonella spp, Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp y Peptococcus spp.

DOSIS Y USO:

Aplicar mediante inyección subcutánea o intramuscular. Bovinos: 7 mg/kg. de peso (1 ml. cada 25 kg. de peso). Caninos y Felinos: 10 mg/kg. de peso (0.15 ml. cada 2.5 kg de peso). Suministrar una vez por día durante un período de hasta 5 días.

VENTAJAS CLAVE PARA USAR EN TAMBO:

Luego de su aplicación no requiere períodos de restricción en leche. El costo del tratamiento se reduce por no tener que descartar la leche de los animales tratados. Amplio espectro de acción. Rápida y excelente absorción.

Activo contra cepas resistentes productoras de B-lactamasa. Notable difusión en todos los tejidos incluyendo huesos.

Activo en presencia de secreciones y pus. No requiere cuidados especiales para su conservación. Es un producto preparado listo para usar.

EFICIENTE ACTIVIDAD TERAPEUTICA EN TAMBO CUANDO SE PRESENTAN CASOS DE:

Mastitis: Septicémicas y de otros tipos, combinada con pomas intramamarios, pietín, metritis, heridas y abscesos, infecciones en general: causadas por gérmenes sensibles a las cefalosporinas.

PRECAUCIONES:

Agitar bien antes de emplear. Desinfectar la zona de aplicación. Friccionar luego de la aplicación. La Cefalexina no tiene acción sobre las células bacterianas en reposo; la asociación con bacteriostáticos está contraindicada. No existen riesgos para los operarios o usuarios. Personas con antecedentes de hipersensibilidad a los b-lactámicos deberán proceder con precaución al manipular el producto. Utilizar con precaución en pacientes con trastornos renales. Mantener alejado del alcance de los niños. Conservar a temperatura ambiente de entre 10° y 25° C.

Restricciones de uso: No faenar animales para consumo humano antes de transcurridos los cuatro días del último tratamiento.

PRESENTACION:

Viales de vidrio de 100 ml

