

CEFTIOKYYX



Antibiótico - Cefalosporínico - Suspensión estéril inyectable

Uso veterinario



FORMULA:

1 ml de producto contiene:

Ceftiofur (como clorhidrato)..... 50 mg*

Vehículo c.s.p..... 1 ml

*(equivalente a 53,49 mg de ceftiofur clorhidrato)

DESCRIPCION:

CEFTIOKYYX es una formulación antibiótica lista para usar por vía parenteral. Cada ml de CEFTIOKYYX Suspensión Estéril contiene Clorhidrato de Ceftiofur equivalente a 50 mg de Ceftiofur. Este principio activo es una cefalosporina de tercera generación activa contra bacterias Gram-negativas y Gram-positivas incluyendo cepas productoras beta-lactamasas, de acción bactericida.

PRESCRIPCION:

Ceftiokeyx está indicado para el tratamiento de neumonías de origen bacteriano y Pietín en bovinos, y neumonía bacteriana o pleuroneumonía en porcinos.

CARACTERISTICAS: Ceftiokeyx otorga rápidos resultados, ya que después de su administración se observa una mejora en el estado clínico de los animales y un límite en la proliferación de la patología a los otros animales de la explotación. También provoca una normalización de la temperatura del animal desde el primer día de tratamiento. Asimismo, se observa la recuperación en el consumo de alimento minimizándose así la pérdida de peso.

ORGANISMOS SUSCEPTIBLES:

Gram negativos: *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolítica*, *Haemophilus somnus*, *Bacteroides fragilis* (grupo), *Bacteroides* spp *Bacteroides melaninogenicus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Escherichia coli*, *Moraxella bovis*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella typhimurium*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus suis*.

Gram positivos: *Staphylococcus hyicus*, *Streptococcus suis*, *Peptostreptococcus anaerobius* Beta-haemolytic, *Streptococcus* spp.

DOSIS Y USO:

Bovinos: 1 a 2,2 ml de suspensión por cada 50 kg intramuscular o subcutánea. Esta dosificación equivale a: 1,0 – 2.2 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal Porcinos: 0,6 a 1 ml por cada 10 kg. de peso, por inyección intramuscular, lo que equivale a 3,0 – 5,0 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal. El tratamiento debe repetirse cada 24 horas durante dos días consecutivos. La duración del tratamiento puede prolongarse de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. Desinfectar la zona de aplicación. No suministrar a animales de comprobada sensibilidad a la droga. Utilizar instrumental estéril para extraer el producto del envase.

Evitar el contacto con el producto durante su empleo. Si se produjera exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón.

No administrar por vía endovenosa en cerdos. Sólo por vía intramuscular.

Lavarse las manos y cambiar la ropa después de haber administrado el producto. Mantener condiciones de higiene antes, durante y después de la aplicación de producto.

Las dosis y advertencias sugeridas en todos los casos quedan a consideración del médico veterinario actuante.

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas. Una vez abierto el envase, descartar el producto sobrante no utilizado.

Conservar entre 15° y 25° C. No congelar. Agitar bien antes de su uso.

Restricciones de uso: Los bovinos pueden ser faenados luego de 48 horas de efectuado el último tratamiento. No se requiere período de restricción de leche ni descarte durante la lactancia.

Período de retiro en cerdos: 5 días.

PRESENTACION:

Viales de vidrio de 50 y 100 ml.

(Podría ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas)

