

CTC 200 KYXON



Uso veterinario



Antibiótico - Premezcla granular para uso oral en alimento

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Clortetraciclina Hcl..... 200 mg

Excipientes c.s.p..... 1 g

DESCRIPCION:

CTC 200 es una premezcla antimicrobiana para ser administrada en el alimento de los cerdos y las aves. Su ingrediente activo, la Clortetraciclina, permite prevenir y controlar enfermedades que afectan a cerdos y aves, contribuyendo a mejorar la velocidad de crecimiento y conversión alimenticia de los animales afectados.

PRESCRIPCION:

CTC 200 es altamente activo frente a una extensa nómina de bacterias Gram positivas y Gram negativas, tanto aerobios como anaerobios, así como microorganismos susceptibles entre los que se encuentran: ciertas especies de *Mycoplasmas*, *Rickettsias* y *Chlamydias* del grupo linfogranuloma, psitacosis, así como protozoos y hongos patógenos.

Porcinos: Control y tratamiento de infecciones entéricas y respiratorias como rinitis atrófica, neumonía enzoótica, neumonía por *Haemophilus*, enteritis necrótica, enteritis no específica, disentería, diarrea post destete, adenomatosis intestinal porcina, infecciones asociadas con *Escherichia coli* y con *Salmonella colerasuis*, estreptococosis, pleuroneumonías, Enfermedad de Glasser, problemas reproductivos asociados a *Leptospirosis*, problemas articulares ocasionados por *Streptococos* y *Estafilococos*.

Aves: Control y tratamiento de infecciones secundarias a virus, enfermedades por coccidios o *Micoplasmas*, estrés o mortandad temprana por causas inespecíficas (colisepticemia, septicemia del pato, onfalitis, cólera aviar, enfermedad de los pollitos, coriza, enfermedad respiratoria crónica causada por *Mycoplasma gallisepticum*, o *Mycoplasma synoviae* y complicada con *Escherichia coli*, problemas digestivos causados por *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium*, *Moraxella anatipestifer*).

Activo frente a: *Streptococcus beta hemolítico*, *Streptococcus viridans*, *Streptococcus faecalis*, *Enterococcus spp*, *Clostridium perfringens*, *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Brucella spp*, *Vibrio cholerae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium*, *Moraxella anatipestifer*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus ducrey*, *Pseudomonas pseudomallei*, *Leptospira spp*, *Treponema pallidum*, *Borrelia spp*, *Actinomices israelii*, *Entamoeba histolytica*, *Enterobius vermicularis*, *Rickettsia prowasekii* (tifus exantemático), *Rickettsia typhi* (tifus endémico), *Rickettsia rickettsii* (fiebre de las montañas rocallosas), *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Chlamydia psittaci* (psitacosis), *Chlamydia trachomatis* (tracoma), *Bacteroides fragilis*.

DOSIS Y USO:

Vía oral, mezclado con el alimento.

Porcinos: debe administrarse a razón de 2 kg por tonelada de alimento (equivalente a 400 ppm) durante 7- 14 días continuos. El tratamiento se debe mantener hasta que los signos de la enfermedad ya no sean aparentes. **Aves:** la dosis recomendada en aves es de 300-400 ppm o bien 20- 60 mg/kg de peso vivo/ día, o sea de 1,5 kg a 2 kg por tonelada de alimento. Se recomienda un período de tratamiento de 7 días consecutivos, pero se debe mantener hasta que los signos clínicos no sean aparentes. Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Almacenar en el paquete original en un lugar fresco y seco entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje contenedores vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. Mantenga una ventilación adecuada cuando administre el producto. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Validez después de ser mezclado con la alimentación: 15 días. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: ninguna.

Efectos secundarios: en raras ocasiones, la sobredosis puede causar diarrea y sobrecrecimiento de hongos y levaduras. Bajo tales condiciones, retire la medicación e informe a su veterinario.

CTC200 Kyxon no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Periodo de retiro: 7 días en aves y porcinos. No usar en aves productoras de huevos destinados a consumo humano.

PRESENTACION:

Bolsas de 25 kg



Av. Pedro Goyena 1432, 1°A
Buenos Aires, Argentina.
Email: info@kyxon.com.ar