

FLOXON 200B



Uso veterinario



Quimioterápico - Solución para uso oral

FORMULA:

1 ml de producto contiene:

Enrofloxacin.....200 mg

Bromhexina.....15 mg

Vehículo c.s.p.....1 ml

DESCRIPCION:

FLOXON 200B es un quimioterápico al 20% de enrofloxacin combinado con bromhexina, que tiene una acción mucolítica. Es una solución para el tratamiento oral de pollos de engorde, reproductoras, pollitas de reemplazo de 16 semanas de edad.

PRESCRIPCION:

FLOXON 200B está especialmente indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas en aves de corral, producidas por bacterias Gram positivas y Gram negativas y / o Micoplasmas.

Actividad antibacteriana de la enrofloxacin: Coagulasa negativa Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella spp, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus stuartii, Providencia spp, Salmonella spp, Shigella spp, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp, Legionella, Campylobacter spp, Bordetella spp, Pasteurella spp, Moraxella spp, Clostridium difficile, Bacteroides spp, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamidia.

DOSIS Y USO:

Por vía oral, diluir en el agua de bebida.

Aves: A razón de 10 mg/kg de peso vivo/día, aproximadamente 25 ml de Floxon 200B por cada 100 L de agua de bebida.

Duración: tratamiento general: 3 días. Salmonellosis: 5 días. Consulte con su Médico Veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y de acuerdo al consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Use ropa adecuada y protectora cuando administre medicamentos. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15 ° C y 25 ° C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: anticoagulantes, aluminio, cimetidina, xantinas en general. En casos de trastornos en el sistema nervioso central y en animales muy jóvenes debido a problemas en las articulaciones.

Efectos secundarios: trastornos gastrointestinales, prurito de la piel y / o fotosensibilidad, dolor en las articulaciones, convulsiones. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

FLOXON 200B no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Tiempo de retiro: 10 días. No usar en aves cuyos huevos se destinen a consumo humano.

PRESENTACION:

Botella de 1 Litro.



Av. Pedro Goyena 1432, 1°A
Buenos Aires, Argentina.
Email: info@kyxon.com.ar