



Anti-inflamatorio - Antipirético- Solución estéril inyectable

Uso Veterinario



FÓRMULA: Cada ml de producto contiene:

Flunixin meglumine 50 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

DESCRIPCIÓN: FLUNIKYX es una solución inyectable estéril compuesta por Flunixin, que es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y un analgésico no narcótico con propiedades antipiréticas. Se utiliza en el alivio de la inflamación y el dolor asociados con trastornos musculoesqueléticos y cólicos. Además, se usa para el control de reacciones de inflamación aguda asociadas con enfermedades infecciosas. Flunixin también se aplica como terapia complementaria en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Flunixin meglumine es un potente analgésico no narcótico, no esteroideo, con actividad antiinflamatoria y antipirética. Es significativamente más potente que la pentazocina, la meperidina y la codeína como analgésico en la prueba de la pata de levadura de rata.

INDICACIONES: Dolor antipirético, antiflogístico y anti muscular, utilizado para fiebre y enfermedades inflamatorias en ganado, ovejas, cabras, caballos, cerdos y pequeños animales; dolor muscular y dolor de tejidos blandos, fiebre, inflamación de endotoxinas y septicemia en perros.

Bovino: está indicado para el control de la pirexia asociada con la enfermedad respiratoria bovina, la endotoxemia y la mastitis aguda bovina. También está indicado para el control de la inflamación en la endotoxemia y como complemento de la terapia antimicrobiana para reducir los signos clínicos de inflamación aguda en casos de enfermedad respiratoria infecciosa.

Caballos: está indicado para el alivio de los signos inflamatorios asociados con los trastornos musculoesqueléticos y para el alivio del dolor visceral asociado con los cólicos.

Porcinos: está indicado como terapia complementaria en el tratamiento de enfermedades respiratorias porcinas.

DOSIS Y USO: Para administración intramuscular o intravenosa.

En bovinos, ovinos y caprinos: por vía intravenosa, siempre después de determinar la causa de la inflamación e iniciar el tratamiento adecuado. En porcino: profundo por vía intramuscular. Se pueden administrar una o dos inyecciones cada 12 horas; El número de dosis dependerá de la respuesta del animal. En caballos: por vía intravenosa una vez al día o por vía intramuscular hasta por cinco días. En perros: solo por vía intravenosa cada 24 horas como máximo durante 3 días.

Bovinos, ovinos y caprinos: la dosis recomendada es de 2,0 ml / 45 kg de peso corporal (2,2 mg / kg). Porcinos: 2,0 ml / 45 kg de peso corporal (2,2 mg / 1 kg). En cerdas afectadas con S.M.M.A. El medicamento no debe depositarse en el tejido adiposo. Caballos: la recomendación para los trastornos músculo-esqueléticos es de 1,0 ml / 45 kg (1,1 mg / 1 kg). Perros: 0.02 ml / kg de peso corporal (1.1 mg / kg).

Injecte el producto lentamente y aplique a temperatura corporal. La administración debe interrumpirse de inmediato si se presentan signos de intolerancia. Se debe proporcionar un suministro de agua adecuado.

PRECAUCIONES: El producto debe almacenarse en su envase original, entre 15 ° y 25 ° C, protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. El operador debe usar máscara, gafas, guantes y guantes de goma. Mantenga una ventilación adecuada cuando se aplique el producto. Saque el producto del paquete con un equipo estéril. No exceda la dosis recomendada o la duración del tratamiento.

Contraindicaciones: No utilizar en caballos utilizados en deportes de competición. No administrar a yeguas o cerdas preñadas, o 48 horas antes del parto esperado hasta la expulsión posparto de la placenta en vacas. No utilizar en mares lactantes que producen leche para consumo humano. No utilizar en toros destinados a la cría, ya que no se han investigado sus efectos reproductivos en estas clases de ganado. No administrar a animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos o animales que padecen enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. Está contraindicado en animales con riesgo de ulceración o hemorragia gastrointestinal, donde hay evidencia de discrasia sanguínea o hipersensibilidad al producto. No administrar a animales sometidos a anestesia general hasta que estén completamente recuperados. Evite la inyección intrarterial o la administración concurrente de otros AINE y fármacos nefrotóxicos. El uso en cualquier animal de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada puede implicar riesgos adicionales. Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la flunixin.

Efectos secundarios: las reacciones adversas incluyen irritación gastrointestinal, ulceración, cambios en la hematología y, en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, un potencial de daño renal. En casos raros, se han observado reacciones anafilactoides graves, ocasionalmente con desenlace fatal.

PERIODO DE RETIRO: - Para carne: bovinos, ovinos y caprinos: 14 días. Cerdo: 21 días. - Para la leche: Ganado: 2 días.

No utilizar en caballos productores de carne para consumo humano.

PRESENTACION: Viales de vidrio de 100 ml.

