

IVERXON



Antiparasitario Interno y Externo - Solución estéril inyectable

Uso veterinario



FORMULA:

1 ml de producto contiene:

Ivermectina..... 10 mg

Vehículo c.s.p.....100 ml

DESCRIPCION:

IVERXON es una solución estéril de 1% p / v de ivermectina lista para ser utilizada por vía subcutánea, que a dosis única es efectiva para el tratamiento y el control de parásitos externos e internos, como gusanos redondos gastrointestinales, pulmonares y renales en los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y camellos. El producto está formulado para que al administrar 1 ml. cada 50 kg. de peso vivo, se suministren 200 mcg/kg. de peso corporal.

PRESCRIPCION:

Está indicado para el efectivo control de los siguientes parásitos:

Parásitos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi* (incluidos los estados inhibidos) (bovinos, camellos), *O. lyrata* (bovinos, camellos), *Ostertagia circumcincta* (ovinos), *Ostertagia trifurcata* (ovinos), *Ascaris suum* (cerdos), *Haemonchus placei* (bovinos, camellos), *Haemonchus contortus* (ovinos), *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus axei* (bovinos, camellos, ovinos), *Trichostrongylus colubriformis* (bovinos, camellos, ovinos), *Trichostrongylus vitrinus* (ovinos), *Cooperia oncophora* (bovinos, camellos), *Cooperia punctata* (bovinos, camellos), *Cooperia pectinata* (bovinos, camellos), *Cooperia curticei* (ovinos), *Oesophagostomum radiatum* (bovinos, camellos), *Oesophagostomum colombianum* (ovinos), *Oesophagostomum venulosum* (ovinos), *Nematodirus helvetianus* (bovinos, camellos), *Nematodirus spathiger* (bovinos, camellos), *Nematodius filicollis* (ovinos), *Bunostomum phlebotomum* (bovinos, camellos), *Toxocara vitulorum* (bovinos), *Hyostrongylus rubidus* (cerdos), *Oesophagostomum* spp (cerdos), *Strongyloides papillosus* (bovinos, camellos), *Strongyloides ransomi* (cerdos), *Trichuris* spp (bovinos, camellos), *Trichuris ovis* (ovinos), *Chabertia ovina* (ovinos)

Útil contra el control del piojo mordedor del ganado (*Damalinia bovis*).

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (estados inmaduros e inhibidos) (bovinos, camellos), *Dictyocaulus filaria* (ovejas)

Protostrongylus rufescens (ovejas), *Metastrongylus* spp (cerdos)

Otros parásitos: *Parafilaria bovicola* (bovinos), *Thelazia* sp. (bovinos, camellos), *Stephanurus dentatus* (cerdos).

Myasis cutáneo (estadios parasíticos). *Hypoderma bovis* (bovinos, camellos), *H. Lineatum* (bovinos, camellos), *Dematobia hominis* (ura) (bovinos, ovinos). *Chysomya bezziana* (bovinos).

Piojos: *Linognathus vituli* (bovinos, camellos), *Haematopinus eurysternus* (bovinos, camellos). *Haematopinus Suis* (cerdos) *Solenopotes capillatus* (bovinos, camellos).

Ácaros: *Psoroptes bovis* (bovinos, camellos), *Psoroptes ovis* (ovinos), *Sarcoptes scabiei* var. *bovis* (bovinos, camellos). *Sarcoptes scabiei* var. *suis* (cerdos).

DOSIS Y USO:

Debe administrarse por vía subcutánea delante o detrás de la paleta. La dosis recomendada es de 0,2 mg / kg peso corporal para bovinos, ovinos, caprinos y camellos. Aplicar a razón de 1 ml de IVERXON cada 50 kg de peso.

Se recomienda utilizar jeringa y aguja estéril de 10" x 18" para su aplicación.

Para los cerdos, la dosis recomendada es de 0,3 mg / kg de peso corporal por vía subcutánea, se administra 1 ml de IVERXON por cada 33 kg de b.w. (= 0.3 mg / kg peso vivo) vía inyección subcutánea en el cuello. La dosis exacta es muy importante para los cerdos jóvenes. Con el objetivo de lograr el medicamento exacto en dosis de bajo volumen, se recomiendan las jeringas que pueden liberar una dosis baja de 0,1 ml. Para mantener el stock libre de parásitos, use ivermectina regularmente de la siguiente manera:

Cerdos: tratamiento de 7 a 14 días antes del nacimiento, para minimizar la infección en lechones. **Hembras embarazadas:** tratamiento de 7 a 14 días antes del parto. También tratamiento 7 a 14 días antes del servicio. **Machos:** El tratamiento es de al menos dos veces por año. La frecuencia y la necesidad de tratamientos dependen de la agresión parasitaria a la que están expuestos. **Crecimiento:** todos los animales para engorde deben aislarse y tratarse con una inyección de IVERXON antes de transferirlos a las salas de engorde. Los cerdos expuestos al suelo pueden necesitar un nuevo tratamiento si se produce una reinfección.

PRECAUCIONES:

Este producto no es para ser usado por vía endovenosa ni intramuscular. Proteja el frasco de la luz guardándolo en su caja de cartón. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar entre 15° y 25° C. La Ivermectina cuando se pone en contacto con la tierra se adhiere rápidamente a ésta y se torna inactiva con el tiempo. Los envases de la droga y cualquier otro sobrante deben ser descartados en forma segura de acuerdo a las regulaciones locales, ya que podrían afectar en forma adversa a los peces y a ciertos organismos acuáticos.

Contraindicaciones: No administrar a animales en estado febril, estresados o gravemente debilitados.

Efectos adversos: Luego de la administración subcutánea, puede producir malestar pasajero en algunos animales. Ocasionalmente se ha observado una tumefacción en los tejidos blandos en el punto de administración. Estas reacciones desaparecen sin necesidad de tratamiento. El nivel de uso recomendado, no presenta efectos adversos sobre la fertilidad de vacas y toros.

Restricciones de uso: No se sacrificarán animales cuya carne se destine a consumo humano hasta transcurridos 35 días del último tratamiento. No usar en vacas lecheras durante la lactancia, ni tampoco dentro de los 28 días previos al parto.

Periodo de retiro en otras especies: 28 días.

PRESENTACION:

Viales de 100 ml.

