

KYDOX 100i

Antibiótico - Solución estéril inyectable



Uso Veterinario

FORMULA: 1 ml contiene:

Doxiciclina (hclato)*..... 100 mg

Excipientes q. to..... 1 ml

*(equivalente a 115 mg de doxiciclina)



DESCRIPCION:

KYDOX 100i es una solución inyectable de doxiciclina, lista para ser utilizada por vía intramuscular contra varias infecciones bacterianas. La doxiciclina es bacteriostática primaria y se cree que ejerce su efecto antimicrobiano mediante la inhibición de la síntesis de proteínas. La doxiciclina es activa contra una amplia gama de organismos gram positivos y gram negativos.

Las drogas en la clase de tetraciclina tienen espectros antimicrobianos muy similares, y la resistencia cruzada entre ellos es común. Los microorganismos pueden considerarse susceptibles a la doxiciclina (es probable que respondan a la terapia con doxiciclina) si la concentración inhibitoria mínima (MIC) no es superior a 4 mcg / ml. Los microorganismos pueden considerarse intermedios (con resistencia parcial) si la CIM es de 4 a 12.5 mcg / ml y resistentes (no es probable que respondan a la terapia) si la CIM es mayor de 12.5 mcg / ml.

INDICACIONES:

El producto es un antibiótico, utilizado para el tratamiento de infecciones sistémicas en serie debido a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, protozoos como Anaplasma y Theileria spp, Rickettias, micoplasma y ureaplasma. Tiene buenos efectos para la prevención y el tratamiento de resfrío, la neumonía, la mastitis, la metritis, la enteritis, la diarrea, el control de las infecciones postoperatorias y posparto en bovinos, ovinos y porcinos. Al mismo tiempo, tiene muchas virtudes como la no resistencia, los efectos rápidos de larga duración y de alta acción.

DOSIS Y USO:

Administración intramuscular.

Bovinos y ciervos: 1.02-0.05 ml por 1 kg de peso corporal.

Ovejas y cerdos: 0.05-0.1 ml por 1 kg de peso corporal.

Perros, gatos y conejos: 0.05-0.1 ml por tiempo.

Aplicar una vez al día, durante 2 a 3 días.

PRECAUCIONES:

El producto debe almacenarse en su envase original. Almacenar a una temperatura entre 15°C y 25°C, protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. El operador debe usar máscara, gafas, guantes y guantes de goma. Mantenga una ventilación adecuada cuando se aplique el producto. Saque el producto del paquete con un equipo estéril. El producto tiene cierta estimulación para el órgano del cuerpo. Inyecte en más sitios para grandes dosis. Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar junto con penicilina.

No administrar con cationes divalentes o trivalentes porque pueden quelar la tetraciclina y disminuir la absorción.

PERIODO DE RETIRO: Carne: 21 días. No utilizar en vacas lecheras que producen leche para consumo humano.

PRESENTACION:

Viales de vidrio de 100 ml.

