

KYDOX 500



Antibiotico - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g contiene:

Doxiciclina (como hclato) 500 mg*

Excipientes c.s.p 1 g

*(equivalente a 575 mg de doxiciclina hclato).

Uso veterinario



DESCRIPCION:

Kydox 500 es un polvo para uso oral compuesto por doxiciclina que pertenece al grupo de las tetraciclinas y actúa bacteriostáticamente contra muchas bacterias Gram-positivas y Gram-negativas como Bordetella, Campylobacter, E. coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus y Streptococcus spp. La doxiciclina también es activa contra Chlamydia, Mycoplasma y Rickettsia spp. La acción de la doxiciclina se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas. La doxiciclina tiene una gran afinidad por los pulmones y, por lo tanto, es especialmente útil para el tratamiento de infecciones respiratorias bacterianas.

PRESCRIPCION:

Kydox 500 está indicado para el tratamiento de infecciones gastrointestinales y respiratorias causadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina como Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus y Streptococcus spp. en terneros, cabras, aves de corral, ovejas y cerdos.

DOSIS Y USO:

Administración oral.

Terneros, Caprinos y Ovinos: dos veces al día, 2 g de Kydox 500 cada 200 kg de peso vivo durante 3 a 5 días.

Aves y Cerdos: (20 mg/kg p.v.) 40 mg de Kydox 500 /kg de peso vivo por día. Aproximadamente: 400g cada 2000 - 4000 litros de agua durante 3 a 5 días.

Nota: solo para terneros pre-ruminantes, corderos y cabritos.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Almacenar en el paquete original en un lugar fresco y seco entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje contenedores vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. Validez después de ser mezclado con la alimentación: 15 días. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a las tetraciclinas. Administración a animales con una función hepática gravemente alterada. Administración concurrente de penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y cicloserina.

Efectos secundarios: decoloración de los dientes en animales jóvenes. Reacciones hipersensibles. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

Kydox 500 no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Tiempo de espera para terneros caprinos y ovinos: 14 días. Porcinos: 8 días. Aves de corral: 7 días.

No usar en aves ponedoras cuyos huevos se destinan a consumo humano.

PRESENTACION:

Sachets de 100 g, 500 g y 1 kg

(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas.)



Av. Pedro Goyena 1432, 1°A
Buenos Aires, Argentina.
Email: info@kyxon.com.ar