

KYFOS E



Uso veterinario



Combinación Antibiótica - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Fosfomicina cálcica 300 UI..... 250 mg

Eritromicina 100 mg

Excipientes c.s.p 1 g

DESCRIPCION:

Polvo para administrar en el agua de bebida o en el alimento. Este producto es una combinación antibiótica de amplio espectro, indicada para el tratamiento de las enfermedades infecciosas aviares, producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y micoplasmas.

PRESCRIPCION:

Este producto está indicado para el tratamiento oral de aves gallináceas como pollos parrilleros, reproductoras y pollitas de reemplazo. Se indica en los casos de: micoplasmosis, colibacilosis, enfermedad respiratoria crónica, infecciones estafilocócicas, listeriosis, cólera aviar, coriza infecciosa, y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la Fosfomicina y/o Eritromicina.

DOSIS Y USO:

Por vía oral mezclado con el agua de bebida o con el alimento.

Aves: (30-40 mg / kg p.v.) En agua de bebida: 0.5 g por litro de agua potable. En Alimento: agregue 1 kg de producto por tonelada de alimento. Tratar durante 3 a 5 días.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Almacenar en el paquete original en un lugar fresco y seco entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje contenedores vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. Validez después de ser mezclado con la alimentación: 14 días. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: ninguna.

Efectos secundarios: muy ocasionalmente pueden aparecer trastornos gastrointestinales y otras reacciones de hipersensibilidad. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

Kyfos E no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Período de retiro: 7 días.

No usar en gallinas ponedoras en producción de huevos destinados a consumo humano.

PRESENTACION:

Sachets de 100 g, 1 kg y 5 kg.

(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas.)

