

KYFOS T



Uso Veterinario



Asociación Antibiótica - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Fosfomicina Cálcica 300UI 250 mg

Tilosina tartrato.....100 mg

Excipientes c.s.p. 1 g

DESCRIPCIÓN:

Kyfos T es un polvo para ser administrado en agua de bebida o mezclado con alimento. Este producto es una combinación de antibióticos de amplio espectro, indicada para el tratamiento de enfermedades infecciosas aviares causadas por micoplasmas, bacterias Gram positivas y Gram negativas.

PRESCRIPCIÓN:

Este producto está indicado para el tratamiento oral de aves de corral, como pollos de engorde, reproductoras, pollas de reemplazo y cerdos. Está indicado en casos de micoplasmosis, colibacilosis, enfermedad respiratoria crónica, infecciones relacionadas con estafilococos, listeriosis, cólera aviar, coriza infecciosa y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la fosfomicina y/o tilosina.

Como tratamiento para prevenir la enteritis por vibrio, disentería y enfermedades respiratorias en cerdos.

DOSIFICACIÓN Y USO:

Para la administración oral en agua de bebida o alimento.

La dosis para aves y cerdos es de 100-110 mg de KYFOS T por kilogramo de peso corporal.

Aves:

En alimento: KYFOS T 1 kg / tonelada de alimento.

En agua potable: aprox. 1 kg de KYFOS T / 1000 litros de agua. Tratar durante 5 días.

Cerdos:

En la alimentación: 2,5 kg KYFOS T / tonelada de alimentación.

En agua de bebida: 1.5 kg KYFOS T / 1000 litros de agua.

Tratar durante 5 días.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis según las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario de la bandada.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Almacene en su envase original en lugar fresco y seco, entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. No tire recipientes vacíos en vertederos abiertos, deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Cierre el recipiente herméticamente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria a consumir. No utilice soluciones que superen las 24 horas desde la preparación. Validez después de ser mezclado con alimento: 14 días. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: ninguna.

Efectos secundarios: muy ocasionalmente pueden ocurrir trastornos gastrointestinales y otras reacciones de hipersensibilidad. Puede causar edema de la mucosa rectal, diarrea y picazón en los lechones. Si pasan a parar el tratamiento de inmediato. Si observa efectos secundarios graves u otros efectos no mencionados en este aviso, informe a su veterinario.

Kyfos T no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios a las dosis recomendadas.

Restricciones de uso: Período de retiro en aves: 7 días. Cerdos: 14 días. No usar en gallinas ponedoras que producen huevos para consumo humano.

ENVASES:

Sobres de 100 g, 1 kg y 5 kg.

Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas.

