

KYRON 200



Antianémico - Solución estéril inyectable

Uso veterinario



FORMULA:

Por cada ml de producto contiene:

Hierro-dextrano200 mg

(equivalente a hierro elemental)

Vitamina B 12 (cianocobalamina).....100 mcg

Vehículo c.s.p.....1 ml

DESCRIPCION:

Antianémico que aporta el hierro necesario para la formación de hemoglobina (transporte y utilización de O₂), mioglobina y ferroenzimas; y vitamina B 12, que favorece el aumento de la producción de eritrocitos por aumento de la proliferación celular en la médula ósea.

PRESCRIPCION:

Está indicado para tratar anemias hipocrómicas, causadas por deficiencia de hierro, ya sean de origen nutricional, como consecuencia de baja o deficiente ingestión, principalmente en la infancia, la pubertad y la preñez, o producidas por pérdidas masivas de sangre, en casos de carcinomas, heridas de tipo quirúrgico o accidentales, cortopunzantes, traumáticas, etc. Está especialmente indicado para prevenir y tratar la anemia de los recién nacidos, especialmente lechones, corderos, potrillos y terneros principalmente cuando se encuentran sin acceso a la tierra. Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, felinos y caninos.

DOSIS Y USO:

Cerdos: Al tercer día de nacidos se proporciona 100 a 200 mg (0.5 ó 1 ml), y se repite entre los 7 y 21 días de edad. Bovinos: Se aplica según el peso, de 500 mg a 1 g (2.5 ml a 5 ml).

Perros y gatos: 25 a 35 mg (0.12 ml a 0.17 ml).

Equinos: 400 mg (2 ml) a los 8 días. Repetir 1 semana después. Ovinos y Caprinos: 300 mg (1.5 ml) entre el segundo y cuarto día.

PRECAUCIONES:

Está contraindicado en casos conocidos de hipersensibilidad a los componentes o para otra anemia que no sea por falta de hierro. Tampoco debe usarse en pacientes con infecciones renales agudas, ni en aquellos que reciban concomitantemente suplementos orales con hierro.

Debe ser usado con extremo cuidado en pacientes con daño en la función hepática.

Usar sólo cuando es claramente necesario, a las dosis recomendadas en animales preñados.

Altas dosis de hierro dextrano pueden causar intoxicación en animales enfermos. Por esta razón, no debe administrarse a animales enfermos.

El Hierro Dextrano utilizado en lechones nacidos de hembras deficientes en Vitamina E y Selenio puede generar náuseas, vómitos y muerte repentina dentro de la hora de inyección.

Mantener fuera del alcance de los niños. Desinfectar la zona de aplicación. Utilizar instrumental, agujas y jeringas previamente esterilizadas para extraer el producto del envase. Mantener condiciones de higiene antes, durante y después de la aplicación de producto. Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas. Una vez abierto el envase, descartar el producto sobrante no utilizado.

Conservar a temperatura ambiente entre 15° y 25°C.

PRESENTACION:

Vial de vidrio de 50 ml y 100 ml.

(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas)

