

KYXOFLOX 100

Antibiótico - Solución para uso oral

FORMULA:

1 ml de producto contiene:

Florfenicol..... 100 mg

Vehículo c.s.p..... 1 ml

Uso veterinario



DESCRIPCION:

KYXOFLOX 100 es un antibiótico de amplio espectro de excelente absorción intestinal, amplios márgenes de seguridad, gran resistencia a la inactivación bacteriana y rápida eliminación de tejido.

El florfenicol ha mostrado un espectro más amplio que el cloranfenicol e incluso su otro análogo: el tiamphenicol. También muestra una buena actividad contra algunas bacterias resistentes al cloranfenicol. Como se considera que el grupo cloranfenicol p-nitro causa anemia aplásica en los humanos, algunos radicales han sido reemplazados en la estructura florfenicol, por ejemplo, el tercer grupo hidroxilo de carbono ha sido reemplazado por un átomo de flúor, manteniendo la misma forma de cloranfenicol en espacio y lo mismo que en el tiamphenicol, el grupo p-nitro es reemplazado por un radical azufre. El cloranfenicol y tiamphenicol pueden ser inactivados por enterobacterias género por acetilación del grupo hidroxilo en 1 y 3 átomos de carbono, en la cadena propanodiol que no puede suceder con florfenicol debido a su unión de flúor por lo que es más fuerte contra microorganismos patógenos en comparación con sus dos análogas.

PRESCRIPCION:

KYXOFLOX 100 está indicado para el tratamiento curativo de infecciones entéricas y respiratorias causadas por E. coli y otras bacterias sensibles al florfenicol, tales como enteritis colibacilar, colibacilosis respiratoria, colisepticemia, complicaciones relacionadas con E. Coli de enfermedades infecciosas (Coryza, c.r.d.). Indicado para el tratamiento del Síndrome Respiratorio Porcino causado por cepas de: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, sensible a Florfenicol.

Gram negativos: Pasteurella haemolytica, Haemophilus influenzae, Pasteurella multocida, Haemophilus sommus, Escherichia coli, Salmonella spp, Moraxella spp, Klebsiella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Treponema hyodysenteriae, Bacteroides spp, Bordetella bronchiseptica, Proteus spp., Neisseria spp. Gram positivo: Corynebacterium pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus zooepidemicus, Staphylococcus aureus. En cerdos: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis.

Para el tratamiento de aves de corral (pollos de engorde, reproductoras y pollitas de reemplazo) y porcinos.

DOSIS Y USO:

Para administración oral en agua de bebida.

Aves: 1 ml de producto en 1 litro de agua bebida (20 mg / kg de peso corporal) durante 3 a 5 días.

Porcinos: 50 a 100 ml de producto cada 100 litros de agua potable (10-20 mg / kg de peso corporal) durante 5 días.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Use ropa adecuada y protectora cuando administre medicamentos. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15 ° C y 25 ° C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: administración concurrente junto con penicilinas.

Efectos secundarios: Puede observarse comúnmente diarrea y/o eritema, edema, transitorio perianal y rectal, estos efectos se pueden observar durante una semana. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

KYXOFLOX 100 no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Período de retiro en aves: 5 días. Periodo de retiro en cerdos : 16 días.

No administrar en aves cuyos huevos se destinen a consumo humano.

PRESENTACION:

Botellas de 1-litro.



Av. Pedro Goyena 1432, 1ºA
Buenos Aires, Argentina.
Email: info@kyxon.com.ar