

KYXOFLOR 200P



Antibiótico - Polvo soluble para uso oral

Uso veterinario

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Florfenicol..... 200 mg

Excipientes c.s.p..... 1 g



DESCRIPCION:

Kyxoflor 200P es un antibiótico en forma de polvo soluble de amplio espectro de excelente absorción a nivel intestinal, amplio margen de seguridad, gran resistencia a la inactivación bacteriana y rápida eliminación de tejidos, indicado para el tratamiento de aves y cerdos

PRESCRIPCION:

Tratamiento curativo de infecciones entéricas y respiratorias causadas por E. coli y otras bacterias sensibles al Florfenicol, como: enteritis colibacilar, colibacilosis respiratoria, colisepticemia, complicaciones con E.coli de enfermedades infecciosas (coriza, c.r.d.) de las aves. Para Porcinos: Tratamiento y control del Complejo neumónico causado por Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp y Haemophilus spp. Gram negativos: Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus sommus, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Moraxella spp, Klebsiella spp, Enterococcus spp, Shigella spp, Treponema hyodysenteriae, Bacteroides spp, Bordetella bronchiseptica, Proteus spp., Neisseria spp. Gram Positivos: Corynebacterium pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus zooepidermicus, Streptococcus aureus.

Para el tratamiento de Porcinos, Pollos de engorde, pollitas de reemplazo y reproductoras.

DOSIS Y USO:

Para administración oral en agua de bebida.

Aves: 0.5 g de Kyxoflor 200P por litro de agua (20 mg/kg de peso vivo), durante 3 a 5 días.

Cerdos: 50 a 100 g de Kyxoflor 200P por cada 100 litros de agua (10 - 20 mg/kg de peso vivo), durante 5 días.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Use ropa adecuada y protectora cuando administre medicamentos. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15°C y 25°C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: administración concurrente junto con penicilinas. Animales con hipersensibilidad conocida a la droga

Efectos secundarios: Puede observarse comúnmente diarrea y / o eritema, edema, transitorio perianal y rectal, estos efectos se pueden observar durante una semana. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

KYXOFLOR 200P no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso: Períodos de retiro: Aves: 5 días. Porcinos: 12 días.

No administrar en gallinas ponedoras que producen huevos para consumo humano.

No administrar en hembras gestantes ni en machos que se utilicen con fines reproductivos

PRESENTACION:

500 g y 1 kg.

(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas).

