

# KYXOFLOR LA300



Uso veterinario



## Antibiótico - Solución estéril inyectable

### FORMULA:

1 ml de producto contiene:

Florfenicol..... 300 mg

Vehículo c.s.p..... 1 ml

### DESCRIPCION:

El Florfenicol es un análogo fluorado del Tianfenicol. Es un antibiótico sintético de amplio espectro frente a un gran número de bacterias Gram-negativas y Gram-positivas. Posee efecto principalmente bacteriostático y actúa uniéndose a la subunidad ribosomal 50s, inhibiendo la síntesis de proteína bacterial.

### PRESCRIPCION:

Antibiótico inyectable para el control de enfermedades de los bovinos y porcinos causadas por bacterias sensibles al Florfenicol. Tratamiento de enfermedades respiratorias, incluyendo la enfermedad respiratoria bovina (ERB) de frecuente aparición en feed-lots y animales en confinamiento. Diarreas de terneros. Pietín, Queratoconjuntivitis. Infecciones de tracto genital, endometritis. Infecciones en general. Tratamiento de infecciones respiratorias en porcinos causadas por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles al Florfenicol.

### AGENTES ETIOLOGICOS SUSCEPTIBLES:

Gram negativos: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus sommus*, *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Moraxella* spp, *Klebsiella* spp, *Enterococcus* spp, *Shigella* spp, *Treponema hyodysenteriae*, *Bacteroides* spp, *Bordetella bronchiseptica*, *Proteus* spp, *Neisseria* spp, *Bacteroides melaninogenicus*. Gram positivos: *Corynebacterium pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus zooepidermicus*, *Streptococcus aureus*.

### VIAS DE ADMINISTRACION:

En Bovinos, aplicar por vía intramuscular en la tabla del cuello o por vía subcutánea. En Porcinos aplicar por vía intramuscular.

### DOSIS Y USO:

Vía Subcutánea: Inyectar 2 ml / 15 kg de peso (40 mg/kg), dosis única.

Vía Intramuscular: Inyectar 1 ml / 15 kg de peso (20 mg/kg), 2 dosis con intervalo de 48 horas.

Porcinos: La dosis es 15 mg/kg peso vivo. Administrar 1 ml / 20 kg de peso (15 mg/kg), por inyección intramuscular

### RECOMENDACIONES:

Utilizar instrumental estéril, agujas y jeringas para extraer el producto del envase y para su posterior aplicación. Desinfectar la zona de aplicación. Mantener condiciones de higiene antes, durante y después de la aplicación.

### PRECAUCIONES:

La aplicación del producto puede producir reacción de los tejidos en el lugar de inoculación que desaparece con el tiempo. Dosificaciones superiores a 25 ml es conveniente repartirlas en diferentes puntos. No aplicar más de 10 ml en cada punto de inoculación.

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar entre 10° y 25°C.

Los efectos adversos comúnmente observados en cerdos son, diarrea y/o eritema/edema perianal y rectal transitorios, estos efectos pueden observarse durante una semana.

### Restricciones de uso:

Los animales destinados a consumo humano no deberán ser sacrificados hasta 28 días posteriores al tratamiento.

Periodo de retiro en cerdos: 15 días. No debe aplicarse a vacas en producción de leche destinada a consumo humano. No administrar conjuntamente con penicilinas. No usar en lechones de menos de 2 kg de peso.

No usar en cerdas durante la gestación ni durante la lactación

### PRESENTACION:

Vial de vidrio de 50 y 100 ml.

*(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas)*



Av. Pedro Goyena 1432, 1°A, Buenos Aires, Argentina.  
Email: [info@kyxon.com.ar](mailto:info@kyxon.com.ar)