

# KYXOFLOR PREMIX



Uso veterinario



## Antibiótico - Premezcla para uso oral

### FORMULA:

1 g de producto contiene:

Florfenicol..... 300 mg

Excipientes c.s.p..... 1 g

### DESCRIPCION:

Kyxoflor Premix es un antibiótico de amplio espectro de excelente absorción a nivel intestinal, amplio margen de seguridad, gran resistencia a la inactivación bacteriana y rápida eliminación de tejidos, indicado para el tratamiento de aves y cerdos

### PRESCRIPCION:

Tratamiento curativo de infecciones entéricas y respiratorias causadas por E. coli y otras bacterias sensibles al Florfenicol, como: enteritis colibacilar, colibacilosis respiratoria, colisepticemia, complicaciones con E.coli de enfermedades infecciosas (coriza, c.r.d.) de las aves. Para Porcinos: Tratamiento y control del Complejo neumónico causado por Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp y Haemophilus spp. Gram negativos: Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus sommus, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Moraxella spp, Klebsiella spp, Enterococcus spp, Shigella spp, Treponema hyodysenteriae, Bacteroides spp, Bordetella bronchiseptica, Proteus spp., Neisseria spp. Gram Positivos: Corynebacterium pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus aureus. Para el tratamiento de Porcinos, Pollos de engorde, pollitas de reemplazo y reproductoras.

### DOSIS Y USO:

Se administra por vía oral, mezclado con el alimento.

**Aves** (pollos de engorda, pollitas de reemplazo y reproductoras): 10-20 mg/kg de peso vivo (equivalente a 33.3 mg -66.7 mg de Kyxoflor Premix por kg de peso), durante 3 a 5 días.

**Cerdos:** 2-10 mg/kg de peso vivo (equivalente a 6.7 mg - 33.3 mg de Kyxoflor Premix por kg de peso), durante 5 días consecutivos.

Agregar 80 g de producto por tonelada de alimento Pre-iniciador, iniciador o terminador según el caso.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

### PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Manipular el medicamento veterinario cuidadosamente para evitar la inhalación de polvo y el contacto con piel y ojos durante la incorporación de la premezcla en el pienso, así como durante la administración del pienso medicado a los animales, tomando precauciones específicas: Para el operador, usar mascarilla, gafas, guardapolvos y guantes de goma.

Mantener adecuada ventilación.

Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Use ropa adecuada y protectora cuando administre medicamentos. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15°C y 25°C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: administración concurrente junto con penicilinas. No administrar en hembras gestantes ni en machos que se utilicen con fines reproductivos

Efectos secundarios: Puede observarse comúnmente diarrea y / o eritema, edema, transitorio perianal y rectal, estos efectos se pueden observar durante una semana. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

KYXOFLOR PREMIX no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso: Períodos de retiro: Aves: 5 días. Porcinos: 12 días.

No administrar en gallinas ponedoras que producen huevos para consumo humano.

### PRESENTACION:

5 kg y 20 kg.