

KYXOMOX 500



Antibiótico - Polvo para uso oral

Uso veterinario

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Amoxicilina (como trihidrato)..... 500 mg*

Excipientes c.s.p 1 g

*(equivalente a 574 mg de Amoxicilina Trihidrato).



DESCRIPCIÓN: KYXOMOX 500 es un polvo soluble para ser administrado en el agua de bebida o mezclado con alimento. Este producto está compuesto de un antibiótico de amplio espectro como la amoxicilina.

PRESCRIPCIÓN: Este producto está indicado para combatir afecciones producidas por agentes infecciosos sensibles a la amoxicilina en el aparato respiratorio, genitourinario y digestivo y complicaciones bacterianas de afecciones víricas. Indicado para combatir infecciones provocadas por los siguientes microorganismos: Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Moraxella catharralis, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Salmonella, Escherichia coli y Pasteurella multocida.

DOSIS Y USO: Para administración oral en el agua de bebida o alimento a razón de 20 mg de materia activa por kilogramo de peso vivo durante 3 a 5 días.

Multiplicar la cantidad de peso vivo a tratar por 0,04 para obtener la cantidad (en gramos) de Kyxomox 500 a utilizar. En el caso de medicar el agua de bebida se aconseja renovar el agua cada 8 horas. No guardar para su futuro.

Instrucciones: la dosis a administrar debe ser diluida antes de incluirla al volumen total del agua de bebida o del alimento: en 10 litros de agua o en 10 kg de alimento.

Para aves: Agregar 0,266 g de Kyxomox 500 / litros de agua / día o 400 g de Kyxomox 500 / tonelada de alimento / día.

Para porcinos: Agregar 0,70 g de Kyxomox 500 / litros de agua / día o 1,12 kg de Kyxomox 500 / tonelada de alimento.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Almacene en el envase original en un lugar fresco y seco entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje contenedores vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No usar soluciones que tengan más de 12 horas de preparadas. El producto se mantiene estable una vez mezclado con el alimento, por el término de 7 días. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las penicilinas. No administrar por vía oral a conejos, cobayos, hámster y équidos, ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre población bacteriana cecal.

Efectos secundarios: sarpullidos, erupciones en la piel y posibles diarreas y otras reacciones de hipersensibilidad. Si nota algún efecto secundario grave u otro efecto no mencionado en este aviso, informe a su veterinario.

Kyxomox 500 no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Período de Retiro en Aves: Deben transcurrir 24 horas entre el último tratamiento y el sacrificio del animal para destinar la carne al consumo humano. **Período de Retiro en Cerdos:** 15 días antes del sacrificio del animal para destinar la carne al consumo humano.

No utilizar en aves cuyos huevos se destinan para el consumo humano.

PRESENTACION:

Bolsas de 400 g, 1kg y 5 kg.

(Puede ser posible que no todas las presentaciones estén disponible para comercializar)

