

KYXOTIL P



Uso veterinario



Antibiótico - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Tilmicosina (como fosfato)..... 200 mg*

Excipientes c.s.p 1 g

*(equivalente a 266 mg de tilmicosina fosfato).

DESCRIPCION:

KYXOTIL P es una premezcla medicinal conteniendo Fosfato de Tilmicosina para ser administrado en el alimento y en el agua de bebida de aves y cerdos.

PRESCRIPCION:

La Tilmicosina es un antibiótico macrólido, sintetizado a partir de la Tilosina, usado en porcinos como aditivo de los alimentos para el control de enfermedades respiratorias asociadas con: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*. De comprobada acción frente a *Mycoplasma gallisepticum* en aves, puede ser también administrado en el agua de bebida. La Tilmicosina es captada por macrófagos y polimorfonucleares y transportada al lugar infectado, alcanzando altas concentraciones por prolongado período de tiempo. Su comportamiento farmacocinético-farmacodinámico (acción antibacteriana, concentración dependiente, buena liposolubilidad, elevada distribución tisular, penetración y acantonamiento intracelular), la transforma en una herramienta terapéutica de elección para el tratamiento de infecciones bacterianas pulmonares, oculares y podales. La Tilmicosina tiene amplio espectro, con actividad muy significativa frente a bacterias Gram-positivas, ciertas Gram-negativas y micoplasmas: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma bovirhinis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Actinomyces pyogenes*, *Moraxella boris*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium necrophorum*.

DOSIS Y USO:

La dosis para porcinos en formulaciones orales es de 10 a 20 mg /kg por día, equivalente a 200 – 400 mg de Tilmicosina / por kg de alimento, o sea de 1 a 2 g de producto por kg de alimento. La equivalencia de esa misma dosis con respecto al agua de bebida es de 175 a 350 mg de Tilmicosina / L de agua de bebida, o sea 0.87 g a 1.7 g por L de agua de bebida

La dosis para aves es de 10-15 mg / kg por día, equivalente a 50 mg de Tilmicosina / L de agua de bebida o sea, 250 mg de producto / L de agua de bebida.

La equivalencia con respecto al alimento es de 53 g de Tilmicosina por tonelada de alimento o sea, 265 g de producto por tonelada de alimento. Para porcinos: Tratamiento continuo durante 10 a 21 días. Para aves: Tratamiento continuo durante 5 días.

PRECAUCIONES:

El producto debe almacenarse en su envase original a una temperatura entre 10° y 25 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Personas con conocida hipersensibilidad a la droga deben evitar el contacto con el producto. Para el operador, usar máscara, gafas, guardapolvo y guantes de goma.

Mantener adecuada ventilación cuando se aplica el producto. Use con cuidado en animales preñados o en animales destinados a crianza. La duración de este producto una vez mezclado con el alimento, es de 15 días. Para administrar en el agua de bebida, se recomienda preparar la cantidad diaria a consumir. No utilizar las soluciones preparadas que tengan más de 24 horas.

Restricciones de uso:

Período de retiro: 7 días.

No debe utilizarse en animales que producen huevos para consumo humano.

PRESENTACION:

1kg, 5kg y 20kg.

