

KYXOTIL i



Antibiótico - Solución estéril inyectable

Uso veterinario



FORMULA:

Por cada ml de producto contiene:

Tilmicosina (como fosfato) 300 mg*

Excipientes c.s.p..... 1 ml

*(equivalente a 399 mg de tilmicosina fosfato).

DESCRIPCION:

Kyxotil i es una solución inyectable de tilmicosina, lista para usar por vía subcutánea en un bajo volumen, en una única dosis.

INDICACIONES:

La Tilmicosina es un antibiótico macrólido, sintetizado a partir de la Tilosina, para el tratamiento sintomático y específico de la enfermedad respiratoria asociada con Pasteurella y especies de Mycoplasma en ovinos, bovinos de carne y vacas en el período de secado. También es utilizado en queratoconjuntivitis infecciosa bovina y en pietín.

La Tilmicosina es captada por macrófagos y polimorfonucleares y transportada al lugar infectado, alcanzando altas concentraciones por prolongado período de tiempo.

Su comportamiento farmacocinético-farmacodinámico (acción antibacteriana concentración dependiente, buena liposolubilidad, elevada distribución tisular, penetración y acantonamiento intracelular), genera la gran ventaja de administrarla en dosis única y la transforma en una herramienta terapéutica de elección para el tratamiento de infecciones bacterianas pulmonares, oculares y podales. La tilmicosina tiene amplio espectro, con actividad muy significativa frente a bacterias Gram positivas, ciertas Gram negativas y micoplasmas:

Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Mycoplasma dispar, Mycoplasma bovirhinis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus pleuropneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Moraxella boris, Clostridium perfringens, Fusobacterium necrophorum
Especies: Bovinos y ovinos.

DOSIS Y USO:

La dosis para casos de neumonía es de 10 mg/ kg para bovinos y ovinos, 1 ml cada 30 kg de peso vivo. Para queratoconjuntivitis infecciosa bovina y pietín, la dosis puede variar de 1 ml cada 60 kg de peso vivo, a 1 ml cada 30 kg de peso vivo, de acuerdo a la gravedad del caso. Se administra una única dosis por vía subcutánea.

PRECAUCIONES:

El producto debe almacenarse en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar entre 15° y 25 °C. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Personas con conocida hipersensibilidad a la droga deben evitar el contacto con el producto. Para el operador, usar mascarera, gafas, guardapolvo y guantes de goma. Mantener adecuada ventilación cuando se aplica el producto. No usar en jeringas automáticas ni administrar vía intravenosa. Se han reportado reacciones fatales en cerdos, primates no humanos y caballos. Use con cuidado en animales preñados o en animales destinados a crianza.

Restricciones de uso:

La carne de los animales tratados no debe ser destinada a consumo humano hasta 28 días después del último día de tratamiento, para ambas especies. No administrar a bovinos y ovinos cuya leche se destine a consumo humano.

PRESENTACION:

Vial de vidrio de 50 y 100 ml.

(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas)

