

LINCOKYX Spec

Antibiótico - Solución estéril inyectable



Uso Veterinario

FORMULA: 1 ml contiene:

Espectinomicina (sulfato).....	100 mg
Lincomicina (clorhidrato).....	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml



DESCRIPCION:

La solución inyectable LINCOKYX SPEC contiene como sustancias activas en 1 ml de producto Lincomicina (como clorhidrato de lincomicina) 50 mg, Spectinomicina (como sulfato de espectinomicina) 100 mg.

La combinación de lincomicina y espectinomicina actúa de forma aditiva y en algunos casos sinérgica. La espectinomicina actúa bacteriostática o bactericida, dependiendo de la dosis, contra bacterias principalmente gram negativas como *Campylobacter*, *E. coli*, *Mycoplasma* y *Salmonella* spp. La lincomicina actúa bacteriostática contra bacterias principalmente grampositivas como *Mycoplasma*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* y *Treponema* spp. Puede ocurrir resistencia cruzada de lincomicina con macrólidos.

La combinación in vitro es activa contra *Actinobacillus* spp.; *Pasteurella* spp.; *Serpulina hyodysenteriae*; *E. coli*; *Salmonella* spp.; *Campylobacter* spp.; *Bacteroides* spp.; *Actinomyces* spp; *Clostridium* spp.; *Fusobacterium* spp.; *Actinomyces* spp.; *Staphylococcus* spp.; *Streptococcus* spp.; *Mycoplasma* spp.

INDICACIONES:

Infecciones gastrointestinales y respiratorias causadas por lincomicina y microorganismos sensibles a la espectinomicina, como *Campylobacter*, *E. coli*, *Mycoplasma*, *Salmonella*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* y *Treponema* spp., En terneros, ovejas, cabras, gatos, perros, cerdos.

DOSIS Y USO:

Para aplicación intramuscular.

Terneros: 1 ml por 10 kg de peso corporal. (15 mg de actividad combinada por kg de peso corporal) durante 4 días

Cabras y ovejas: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. (15 mg de actividad combinada por kg de peso corporal), una vez al día, durante 3 días.

Porcinos: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. (15 mg de actividad combinada por kg de peso corporal), diariamente durante al menos 3 días, dependiendo de la condición del animal.

Perros y gatos: 1 ml por cada 5 kg de peso corporal. (30 mg de actividad combinada por kg de peso corporal), durante 3-5 días, máximo 21 días.

PRECAUCIONES:

El producto debe almacenarse en su envase original. Almacenar a una temperatura entre 15°C y 25°C, protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. El operador debe usar máscara, gafas, guantes y guantes de goma. Mantenga una ventilación adecuada cuando se aplique el producto. Saque el producto del paquete con un equipo estéril. El contenido del vial debe usarse dentro de los 28 días.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a lincomicina y / o espectinomicina. Administración a animales con insuficiencia renal y / o hepática. Administración concurrente con penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y cicloserina.

Efectos secundarios: reacciones de hipersensibilidad. Poco después de la inyección, puede causar un ligero dolor, picazón o diarrea.

PERIODO DE RETIRO: Para carne:

-Calvas, cabras, ovejas y cerdos: 14 días.

Para leche: 3 días.

PRESENTACION:

Viales de vidrio de 100 ml.



Av. Pedro Goyena 1432, 1°A
Buenos Aires, Argentina.
Email: info@kyxon.com.ar