

LIVERKYX sil



Complemento Nutricional - Protector hepático - Diurético - Solución para uso oral

Uso veterinario

FORMULA:

100 ml contienen:

Silimarina	0,6 g
Cloruro de colina.....	5 g
Vitamina B12.....	1 mg
L- Carnitina clorhidrato.....	5 g
D,L- Metionina.....	1,5 g
L-Lisina monoclorhidrato.....	1 g
Sorbitol (E-420).....	10 g
Manitol (E-421).....	6,5 g
Cloruro de sodio	10 g
Cloruro de potasio.....	7,5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

DESCRIPCIÓN:

Liverkyx es un suplemento alimenticio en forma de solución oral para el control y la regulación de las funciones hepáticas y la vesícula biliar. Para superar la sobrecarga hepática en condiciones de estrés, momento en el que el animal no asimila bien su alimentación, lo que afecta su salud y rendimiento. La parte básica de la preparación tiene una acción categórica contra los problemas hepáticos y vesiculares y también contra los diferentes tipos de manifestaciones patológicas de las que se derivan los problemas. La incorporación de silimarina en la formulación es de vital importancia en Liverkyx ya que este compuesto ha demostrado su acción protectora en varias afecciones hepáticas, de tipo patológico donde existe un compromiso del hepatocito. Esta asociación se destaca por:

A nivel del hígado: Protege la membrana del hepatocito, previene la congestión, degeneración y lisis del mismo. Actúa sobre los fagocitos del Sistema Retículo Endotelial (SER) mejorando su acción detoxificante. Regenera el parénquima hepático, previene el hígado graso y la cirrosis.

A nivel del Sistema Biliar: favorece la formación y excreción de bilis (acción colagoga y colerética).

PRESCRIPCIÓN:

Liverkyx está especialmente recomendado para el control y la ayuda de secuelas de intoxicación causadas por micotoxinas, como un coadyuvante en la grasa del hígado causada por problemas metabólicos o dietas con alto contenido de ácidos grasos. En casos de intoxicación medicinal (por ejemplo, sobredosis de sulfonamidas), condiciones de estrés, enfermedades hepáticas funcionales u orgánicas y enfermedades de la vesícula biliar. También se puede recomendar para los siguientes casos:

1. Mejora la digestión y el metabolismo de los nutrientes principales del alimento, especialmente las grasas.
2. Ayuda la función natural de desintoxicación del hígado, falta de apetito, síndrome del vientre de agua, hidropericardio.
3. Se puede usar junto con anticoccidiales, antibióticos y antiparasitarios para minimizar los posibles efectos dañinos para el hígado.
4. Para mejorar la capacidad de inmunidad y aumentar la resistencia del cuerpo contra las enfermedades.
5. Para mejorar, estimular y recuperar la función del hígado y bilis.

Útil para el síndrome hemorrágico en gallinas ponedoras, para la esteatosis lipídica en pollos de engorde, hígado graso en mamíferos y estimulante de la producción y crecimiento. Como reconstituyente. Como suplemento alimenticio. Para ser utilizado en aves de corral, pavos, terneras, cabras, ovejas y cerdos.

DOSIS Y USO:

Para administración oral diluido en agua de bebida o mezclado en el pienso como complemento de alimento completo.

Para todas las especies:

En agua de bebida: 1 ml de Liverkyx por 1-2 L de agua potable. Aplicar durante 5 días. Si es necesario, la aplicación puede prolongarse o repetirse. Administrar como única fuente de agua de bebida.

En alimento: 2 ml de Liverkyx por kg de alimento completo.

Gallinas ponedoras: 1 ml/L durante 5 días. Repetir la aplicación cada 3-4 semanas, empezar en la semana 20-30 (edad).

Pollos de engorde: 1 ml/L de agua de bebida durante 5 días. Repetir la aplicación cada 2 semanas si es necesario, hasta la remisión total de los síntomas.

Después de tratamientos prolongados con antibióticos y coccidiostáticos, vacunas e intoxicaciones: 1 ml/L de agua de bebida durante 5 días.

El producto también se puede utilizar como suplemento alimenticio desde el nacimiento hasta el sacrificio.

Solo se debe preparar la suficiente cantidad para cubrir los requerimientos diarios. La solución debe reemplazarse cada 24 horas.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15°C y 25°C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: No existen.

Efectos secundarios: No existen.

Tiempo de retiro: No precisa.

PRESENTACION:

Botella de 1 litro y bidón 5 litros.

Puede ser posible que no todos las presentaciones sean comercializados.

