

METAMIZOL Kyxon

Analgésico-Antipirético -Solución estéril inyectable.



FORMULA:

1 ml contiene

Metamizol sódico..... 300 mg

Excipientes c.s.p..... 1 ml

Uso veterinario



DESCRIPCIÓN:

La solución inyectable METAMIZOL KYXON contiene como sustancia activa en metamizol sódico, que es un agente analgésico antipirético, también eficaz para disminuir la inflamación y el antirreumatismo que puede absorberse y surtir efecto muy rápidamente, dura de 3 a 4 horas y no afectará intestinos y movimiento estomacal.

El metamizol pertenece al grupo de derivados de pirazolona y se usa como agente analgésico, antiinflamatorio, antipirético y espasmolítico. Pertenece al grupo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con analgésicos centrales y antipiréticos significativos, pero con un bajo efecto antiinflamatorio (analgésicos débiles). Como todos los analgésicos débiles resp. Los AINE metamizol inhiben la síntesis de prostaglandinas al bloquear la ciclooxigenasa. El efecto analgésico y antipirético se debe principalmente a la inhibición de la síntesis de prostaglandina E2, que está implicada en la sensación de dolor central y periférica y en la nocicepción. Además, el metamizol tiene un efecto espasmolítico en los órganos del músculo liso. El metamizol sódico antagoniza aún más los efectos de la bradiquinina y la histamina.

INDICACIONES:

Antipirético y analgésico. Indicado para el tratamiento del dolor muscular, reumatismo, enfermedades febriles, cólicos, etc., en bovinos, equinos, ovinos, porcinos y perros.

1. Tiene efectos especiales sobre la fiebre alta causada por una infección por bacterias y enfermedades virales o infecciones mixtas, como Eperythrozoon, toxoplasmosis, circovirus, pleuresía infecciosa, etc.

2. Tiene grandes efectos sobre la inflamación, enfermedades febriles, reumatismo, torceduras y otras enfermedades causadas por una variedad de microorganismos patógenos.

DOSIS Y USO:

Para inyección intramuscular.

Por tratamiento: ganado: 20 a 40 mg / kg; Aproximadamente 25 a 56 ml / animal.

Caballos: 20 a 50 mg / kg, aproximadamente 25 a 60 ml / animal.

Ovejas: 20 a 40 mg / kg, aproximadamente: 8-16 ml / animal.

Porcinos: 15 a 50 mg / kg, aproximadamente 5 a 20 ml / animal.

Perros: 20 a 30 mg / kg, aproximadamente 2 a 4 ml / animal.

Las dosis indicadas pueden repetirse cada 8 a 12 horas, según la evolución del paciente.

PRECAUCIONES

El producto debe almacenarse en su envase original. Almacenar a una temperatura entre 15°C y 25°C, protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. El operador debe usar máscara, gafas, guantes y guantes de goma. Mantenga una ventilación adecuada cuando se aplique el producto. Saque el producto del paquete con un equipo estéril.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.

No inyecte en el punto de acupuntura, especialmente no en las partes de las articulaciones, de lo contrario podría causar amiotrofia o disfunción articular.

No lo use junto con clorpromazina para evitar una fuerte caída de la temperatura corporal.

Prohibido su uso con barbitúricos o butazodina, ya que afectará la actividad de la enzima microsomal hepática.

Efectos adversos: el uso a largo plazo puede causar la reducción de granulocitos.

PERIODO DE RETIRO: Carne: 28 días. Leche: 7 días.

No utilizar en caballos cuya carne esté destinada al consumo humano.

PRESENTACION:

Viales de vidrio de 100 ml

