



Uso veterinario

Antibiótico - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Neomicina (como sulfato)..... 500 mg*

Excipiente c.s.p. 1 g

*(equivalente a 765 mg de Neomicina Sulfato).



DESCRIPCION:

Neokyx en un polvo para uso oral compuesto por Neomicina, antibiótico del grupo de los aminoglucósidos.

PRESCRIPCION:

Neokyx está especialmente indicado para el tratamiento de enteritis bacterianas como diarreas, disentería sanguinolenta, disentería vibriónica, disentería de invierno, diarrea blanca, colibacilosis, salmonelosis, causadas por microorganismos tales como E. Coli, Vibrio, Salmonella, en bovinos, porcinos, ovinos y equinos. También para el uso contra enterotoxemia (Clostridium) en ovejas. Neocol también esta indicado para el tratamiento de enteritis bacterial (enteritis no específica) en pollos y pavos.

DOSIS Y USO:

Vía oral, en el agua de bebida o en el alimento. Agregar el producto al agua de bebida, o mezclar con el alimento. Es conveniente, premezclar la cantidad de producto a utilizar en una cantidad de 10 litros de agua, en el caso de medicar con el agua, o en 25 kilos de alimento para el caso de medicar con el alimento. Solo puede usarse en alimentos secos. No debe usarse en suplementos alimenticios líquidos. La dosis apropiada deberá ser agregada al agua de bebida que será consumida por los animales en un período de 12 horas. No permitir otra fuente para el consumo de agua durante el período de tratamiento.

10 miligramos de droga activa por kilogramos de peso vivo. Para obtener la cantidad de producto a utilizar se debe multiplicar la cantidad de peso vivo a medicar por el siguiente factor, el cual es obtenido con el siguiente cálculo: $10/500 = 0.02$ (éste es el factor a utilizar para obtener la cantidad de producto en gramos, a utilizar en cada caso). El tratamiento es continuo De 3 a 7 días para aves, y hasta 14 días en bovinos, porcinos, ovinos y equinos. El tratamiento debería continuarse por 1 o 2 días posteriores a que hayan desaparecido los síntomas de la infección, sin excederse de los 14 días para bovinos, porcinos, equinos y ovinos. Para aves agregar 0.133 g de Neokyx / Litro de agua de bebida / día ó 0.200 g de Neokyx / kg de alimento / día. Para las demás especies, administrar según el consumo diario de alimento y agua de bebida.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis según las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse en su envase original a una temperatura entre 15° y 25° C. Evite la luz solar directa sobre el producto almacenado. La persona encargada de administrar el producto debe usar protectores oculares y guantes de goma. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. No tire recipientes vacíos en vertederos abiertos, deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Mantenga una ventilación adecuada cuando administre el producto. Se recomienda preparar la cantidad diaria de producto que se administrará, ya sea para beber agua o alimento. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. Validez después de ser mezclado con la alimentación: 15 días. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: cuando existe disfunción renal, deshidratación, hipersensibilidad a los aminoglucósidos, hipocalcemia, endotoxemia, obstrucción intestinal o posibles factores de riesgo de insuficiencia renal aguda.

Efectos secundarios: nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular. Menos frecuente: traumatismo local leve del tejido, diarrea, vómitos.

Neokyx no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios a las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Período de retiro: Ganado bovino: 30 días. Cerdos y ovejas: 20 días. Pavos: 14 días. Pollos: 7 días. No usar en vacas lecheras cuya leche se destine a consumo humano. No usar en aves productoras de huevos destinados a consumo humano.

PRESENTACION:

1 kg y 20 kg.

(Puede ser posible que no todas las presentaciones sean comercializadas)

