

OFLUGUR

Bactericida, Viricida, Fungicida & Esporicida- Polvo Desinfectante



Uso Veterinario

FORMULA:

Peroxymonosulfato de potasio 50%

DESCRIPCION:

OFLUGUR es una mezcla estabilizada de compuestos peróxidos, surfactantes, ácidos orgánicos y regulador inorgánico, en forma de polvo. OFLUGUR está recomendado para uso como desinfectante de superficies duras en instalaciones de producción y equipos de transporte en ganadería. OFLUGUR elimina 99.9999% de numerosos patógenos incluyendo 31 cepas bacterianas, 58 virus, y 6 hongos sin evidencia de resistencia, con lo cual se evita la necesidad de realizar rotaciones de diferentes desinfectantes. OFLUGUR oxida depósitos de azufre en proteínas y enzimas interrumpiendo la función de la membrana celular causando la ruptura de la pared celular.

PRESCRIPCION:

Efectivo contra virus, bacterias, esporas y hongos en instalaciones industriales, agrícolas e instalaciones donde se alojan animales.

Viruses

Adenovirus Pneumonia
African Horse Sickness Virus
African Swine Fever Virus
Avian Influenza Virus
Avian Laryngotracheitis Viruses
Bovine Adenoviruses Type 4
Bovine Polyoma Virus
Bovine Pseudocypox Virus
Bovine Viral Diarrhea Virus
Calf Rotavirus
Canine Adenovirus (Canine Hepatitis)
Canine Coronavirus
Canine Parainfluenza Virus
Canine Parvovirus
Chicken Anemia Virus
Coital Exanthema Virus
Distemper Virus
Duck Adenovirus
Duck Enteritis Virus
Egg Drop Syndrome Adenovirus
Equine Arteritis Virus
Equine Contagious Abortion Virus
Equine Herpes Virus (Type 1)
Equine Herpes Virus (Type 3)
Equine Infectious Anemia Virus (Swamp Fever)
Equine Influenza Virus (Type A)
Equine Influenza Virus (The Cough)
Equine Papillomatosis Virus
Feline Calicivirus
Feline Herpes Virus
Feline Infectious Peritonitis Virus
Feline Panleukopenia Virus

Feline Parvovirus
Feline Rhinotracheitis Virus
Foot and Mouth Disease Virus
Helicobacter pylori
Hog Cholera Virus
Infectious Bronchitis Virus
Infectious Bursal Disease Virus
Infectious Canine Hepatitis Virus
Infective Bovine Rhinotracheitis Virus
Leptospira Canicola Virus
Maedi-Visna Virus
Marek's Disease Virus
Mouse Parvovirus
Newcastle Disease Virus
PCVS Virus (PMWS)
Porcine Parvovirus
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRS)
Pseudorabies Virus (Aujeszky's Disease)
Rotaviral Diarrhea Virus
Simian Virus (SV40 Virus)
Swine Influenza Virus
Swine Vesicular Disease Virus
Transmissible Gastroenteritis Virus (TG)
Turkey Herpes Virus
Turkey Rhinotracheitis Virus
Vesicular Stomatitis
Bacteria
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacillus cereus
Bordetella avium
Bordetella bronchiseptica
Brucella abortus

Campylobacter jejuni
Clostridium perfringens
Dermatophilus congolensis
Escherichia coli
Fistulous withers (Poll Evil)
Haemophilus somnus
Klebsiella pneumoniae
Listeria monocytogenes
Moraxella bovis (Pink Eye)
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma hyopneumonia
Mycoplasma mycoides
Pasteurella multocida
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas mallei (Glanders)
Pseudomonas vulgaris
Salmonella choleraesuis
Salmonella typhimurium
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus equi (Strangles)
Streptococcus pyogenes
Streptococcus suis
Taylorella equigenitalis
Treponema hyodysenteriae
Fungi
Aspergillus fumigatus
Fusarium moniliforme
Microsporium canis
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton spp. (Mud Fever)
Trichophyton spp. (Ringworm)

DOSIS Y USO:

Aplicar, diluido previamente en agua, en las superficies a desinfectar. Rocíe, sumerja o limpie con la solución diluida en consecuencia (Oflugur : agua corriente):

- (1) Galpones donde se alojan animales, bebederos y desinfección aérea, 1 : 200;
- (2) Desinfección terminal, equipos, incubadoras, pediluvios, 1 : 200;
- (3) Desinfección de sistemas de agua, 1 : 200.
- (4) Para patógenos específicos: E.coli 1 : 400; Staphylococcus aureus 1 : 400; Streptococcus 1 : 800; Influenza Aviar 1 : 1600; Aftosa (FMD) 1 : 1000; Enfermedad vesicular porcina 1 : 400; Enfermedad de Gumboro 1 : 400; Enfermedad de Marek 1:200; Circovirus 1:200, Virus de la fiebre porcina africana 1:200; Pleuropneumonia 1: 200; Micoplasma 1:200; Salmonella 1: 200; Hongos 1:200.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Usar ropa adecuada y protectora al administrar el producto. Lavarse las manos y cambiarse de ropa después de la administración. Almacene en su envase original a una temperatura entre 15°C y 25°C, evitando la luz solar directa sobre el producto almacenado. Evitar la presencia de materia orgánica antes de aplicar el producto. Las personas con hipersensibilidad conocida a algunos de los ingredientes deben evitar el contacto con el producto. Para el operador, use máscara, gafas de seguridad, goma general y guantes de goma. No tire recipientes vacíos en vertederos de basura abiertos; deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Cierre el recipiente herméticamente después de cada uso. No perforo, perforo ni corte el recipiente. No reutilice el envase vacío. Este producto no es un medicamento. No usar internamente en animales. No tiene contraindicaciones ni restricciones de uso cuando se usa en los niveles recomendados. Este producto es único y exclusivamente para uso externo sobre instalaciones.

ENVASES:

Sachets aluminio de 100 g, 500 g, 1 kg y 5 kg. (Puede ser posible que no todas las presentaciones se comercialicen.)