

OTC LA200



Antibiótico - Solución estéril inyectable

Uso veterinario

FORMULA:

1ml de producto contiene:

Oxitetraciclina*..... 200 mg

Vehículo c.s.p..... 1ml

*(como dihidrato 216 mg).



DESCRIPCION:

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de las infecciones de los bovinos, porcinos, aves y conejos, causadas por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina. OTC LA200 es altamente activo frente a una extensa nómina de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, tanto aerobios como anaerobios, así como microorganismos susceptibles entre los que se encuentran: ciertas especies de micoplasma, rickettsias y clamidias del grupo linfogranuloma, psitacosis, así como protozoos y hongos patógenos. Concepto terapéutico de uso: Con una única aplicación provee niveles sostenidos de antibiótico en sangre durante 3 a 5 días. Las características de acción prolongada van acompañadas con las de un antibiótico de amplio espectro. El tratamiento preventivo puede instituirse en circunstancias de riesgo como son el transporte de ganado, factores meteorológicos, cirugías, partos distócicos, castración.

PRESCRIPCION:

Actúa eficazmente contra los siguientes microorganismos: Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella hemolítica, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes, Salmonella sp, Staphylococcus sp, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, Listeria sp, Bacillus anthracis, Haemophilus sp, Clostridium perfringens, Bacteroides sp, Fusobacterium sp, Rickettsiae sp, Micoplasma sp, Spherophorus necrophorus, Actinomyces pyogenes, Anaplasma marginale.

Bovinos: Anaplasmosis, neumonía, leptospirosis, pietín, mastitis septicémica, carbunclo sintomático, enteritis bacterianas, actinobacilosis, infección umbilical-articular, heridas infectadas y otras infecciones producidas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. Ovinos: Neumonías, Carbunclo sintomático, pietín, mastitis septicémica, prevención de infecciones post-parto y en todas las infecciones específicas o no causadas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina. Porcinos: Neumonías y otras enfermedades respiratorias. Rinitis atrófica, leptospirosis, erisipela, enteritis bacterianas, diarrea de los lechones, infecciones post-quirúrgicas y post-parto y en todas las infecciones causadas por gérmenes gram-positivos y gram-negativos. Aves: Enfermedades crónicas respiratorias complicadas, coriza infecciosa.

DOSIS Y USO:

Bovinos, Ovinos y Porcinos: 1 ml/10 kg. p.v. (equivale a 20 mg de Oxitetraciclina por kg. p.v.). Aves y Conejos: 0,25 ml/kg p.v. (equivale a 50 mg de Oxitetraciclina por kg p.v.). Administrar por vía intramuscular profunda en todas las especies. Se recomienda dividir la dosis y aplicar en lugares separados, no debiéndose inyectar más de 20 ml. por punto de aplicación. En ovinos de más de 50 kg. Es recomendable dividir la dosis y proceder como en el caso anterior. En cerdos con menos de 10 kg. de peso, aplicar vía subcutánea detrás de la oreja; en animales con peso superior a los 10 kg., la aplicación debe ser intramuscular. OTC LA200 es un antibiótico de acción prolongada, por lo que en general es suficiente administrar una sola dosis. No obstante, en infecciones severas puede repetirse la misma a los 3-5 días, quedando a criterio del Médico Veterinario. En todos los casos, respetar la asepsia en las maniobras de aplicación. Puede provocar tumefacción y dolor en el punto de inyección.

PRECAUCIONES:

Almacenar en su envase original. No diluir el producto. Evitar el contacto con boca y manos. Lavarse las manos luego de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar entre 3º y 15º C y protegido de la luz solar directa.

Restricciones de uso:

Entre la finalización del tratamiento y la faena de los animales para consumo humano, deberán transcurrir para bovinos, ovinos y porcinos, 28 días. Para aves y conejos, 5 días.

No usar en vacas en producción de leche para consumo humano. No se recomienda su uso en gatos, perros y equinos. No aplicar en animales alérgicos a la Oxitetraciclina. No administrar penicilinas concomitantemente.

PRESENTACION: Vial de vidrio de 100 ml.

