

TIAMUKYX 80

Antibiótico - Premezcla para uso oral

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Tiamulina hidrógeno fumarato.... 800 mg

Excipientes c.s.p. 1 g

Uso veterinario



DESCRIPCION:

Tiamukyx 80 es un polvo para uso oral compuesto por tiamulina, que es un derivado semisintético del antibiótico Pleuromulin, clínicamente efectivo especialmente sobre micoplasmas, un amplio número de Gram positivos, así como algunas bacterias Gram negativas. Actúa bacteriostáticamente. Para administrar con el alimento o con el agua de bebida de aves y cerdos.

PRESCRIPCION:

La Tiamulina se usa casi exclusivamente en el tratamiento de enfermedades crónicas respiratorias como la neumonía zoonótica y pleuroneumonía en cerdos, y la micoplasmosis de las aves. Normalmente, se proporciona en el alimento o en el agua de bebida en caso de brotes importantes. También se la ha empleado en la disentería porcina. Podría tener efecto subinhibitorio contra especies de *Pasteurella* y resulta más eficaz en este caso, si se la combina con Oxitetraciclina. También se utiliza en el control de la rinitis atrófica. Aparentemente se puede controlar de modo eficaz *Actinomyces pleuropneumoniae* con la administración exclusiva de Tiamulina. La tiamulina es compatible con dosis usuales de oxitetraciclina, clortetraciclina, carbadox, dimetridazol, sulfonamidas, furazolidona, lincomicina y olanquinodox. En especial, resulta sinérgica con oxitetraciclina y clortetraciclina contra *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Bordetella bronchiseptica*. La Tiamulina tiene una actividad muy significativa frente a Micoplasmas y un número amplio de bacterias Gram-positivas y ciertas Gram-negativas: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorinis*, *Mycoplasma anatis*, *Mycoplasma pleuropneumoniae*, *Haemophilus paragallinarum*, *Treponema hyodysenteriae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Streptococcus equi*. Algunas especies de *Leptospira*, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Clostridium perfringens*, *Ureaplasma spp*, *Staphylococcus spp*, *Listeria monocytogenes*. Especies: Porcinos y aves.

DOSIS Y USO:

Para administración oral en el alimento balanceado.

Aves: 10-20 mg/kg p.v. Debe utilizarse 125 g a 250 g de producto por tonelada de alimento, durante 3 a 6 días.

Cerdos: 7.5 – 15 mg/kg p.v. Debe utilizarse 150 g a 300 g de producto por tonelada de alimento.

Tratamiento de disentería: 300 g de producto por tonelada de alimento.

Control y prevención de disentería: 150 g de producto por tonelada de alimento, de 3 a 7 días.

Neumonía enzoótica: 300 g de producto por tonelada de alimento, durante 7 días consecutivos.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis según las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre exposición accidental, lávela con agua corriente y jabón. Almacene en su empaque original en un lugar fresco y seco entre 15° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Las personas con hipersensibilidad conocida al medicamento deben evitar el contacto con el producto. No tire recipientes vacíos en vertederos abiertos, deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Cierre el recipiente herméticamente después de cada uso. La duración de este producto una vez mezclado con el alimento es de 15 días. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a la tiamulina. NO ADMINISTRAR EN ANIMALES QUE SE PROPORCIONAN CON ALIMENTACIÓN MEDICADA QUE INCLUYE MONESINA, SALINOMICINA O NARASINA.

Efectos secundarios: Ocasionalmente puede aparecer eritema o edema leve de la piel y otras reacciones de hipersensibilidad. Si observa efectos secundarios graves u otros efectos no mencionados en este aviso, informe a su veterinario.

Restricciones de Uso: Periodo retiro en aves: 5 días. Periodo de retiro en porcinos: 7 días. No administrar en cerdos de más de 110 kg de peso. No usar en aves ponedoras que producen huevos para consumo humano.

PRESENTACION:

5 kg y 20 kg.

